

EC FERTİLİZER
POTAS TUZU
K-BOMB

Tamamı Suda Çözünür
Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

%W/W
37

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR:

- *ÇOCUKLADAN UZAK TUTUNUZ
- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız

- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız
- * Yutmayınız. Yutulması halinde doktorunuza başvurunuz
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız

TAVSİYELER:

- * Bitkilerin ihtiyacına göre yetiştirme sezonu boyunca damlamadan veya yapraktan uygulanabilir
- * Bordo bulamacı ve alkali ilaçlar hariç diğer bitki besleme ürünleri ve zirai ilaçlar ile karışabilir.

KARIŞABİLİRLİK:

Her türlü ilaç ve gübre ile karışabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / +40°C arasında depolayınız. Ürünü, ambalajı açık olarak asla depolamayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve karışımlar neticesinde meydana gelen olumsuzluklar ile depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

UYGULAMA ZAMANI VE UYGULAMA DOZU

BİTKİLER	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu
MEYVELER Narenciye (portakal, limon, mandalina, greylift), zeytin, elma, armut, kiraz, vişne, bağ, şeftali, kayısı, antep fıstığı, fındık, nar, erik, ayva, ceviz, badem, muz, kivi, avokado, ahududu, böğürtlen vb.	Meyve fidanlıklarında fidanların gelişme dönemlerinde 15-20 gün aralıklarla, Yapraklarını döken meyvelerde ilkbaharda gözlerin patlamasından sonra gelişme durumuna göre ilkbahar ve yaz ayları boyunca ayda 1-2 uygulama yapılmalıdır.	Fidanlarda: 150-200 gr/100 lt su Meyve veren ağaçlarda: 200-250 gr 100 lt su
SEBZELER Domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabak, çilek, karnabahar, kereviz, lahanaya, fasulye, patates, marul, soğan, sarımsak, havuç, ıspanak vb.	Fide döneminden itibaren gelişme dönemi boyunca meyve veren sebzelerde meyve büyüme dönemlerinde ve hasat süresince 7-10 gün aralıklarla uygulanmalıdır.	200-350 gr/da
SÜS BİTKİLERİ Karanfil, gerbera, gül, gypso, krizantem ve diğer kesme çiçek yetiştiriciliğinde	Fide ve fidanların dikiminden 15-20 gün sonra ilk uygulama yapılır. Daha sonra her 10 günde uygulama tekrarlanmalıdır.	200-250 gr/da
TARLA BİTKİLERİ Pamuk, arpa, buğday, mısır, soya, ayçiçeği, tütün, şeker pancarı, mercimek, yar fıstığı vb.	Tohum ekimi yapılan bitkilerde çıkıştan 15 gün sonra hasada kadar 2 haftada 1 uygulama, Tütünde fide dikiminden sonra 8-10 günde 1 uygulama yapılmalıdır.	150-250 gr/da
YEŞİL ALANLAR, İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ vb.	Çim alanlarda, tohumun çıkışından 10 gün sonra ilk uygulama olmak üzere 10 günde 1 defa, Saksılı süs bitkilerinde 15-20 günde 1 defa uygulama yapılmalıdır.	150-200 gr/da
FİDELİKLER/FİDANLIKLAR	Gelişme durumuna göre yağmurlama ve sisleme şeklinde haftada 1-2 uygulama yapılmalıdır.	150-200 gr/da

Yapraktan ve topraktan uygulanabilir.

Tescil no:

Lisans no: 759

Üretim Tarihi: Kapakta yazmaktadır.

Son kullanma tarihi: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürün parti no: Kapakta yazmaktadır.

Net ağırlık: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - kg

ÜRETİCİ: LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Antalya Organize sanayi bölgesi, 1.kısım Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı /Antalya

Tel: 0 242 321 19 98 Fax: 0 242 322 98 81 www.lidergubre.com.tr

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ

