

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATI – EDDHA

LEADER FER

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ</u>	<u>(W/W)</u>
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)	% 6

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı 3-9
**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



UYARILAR

*Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız. *Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. *Ürünü kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA ŞARTLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / +45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK :Yüksek Alkali İlaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisini altındadır.

Lisans no: 759 Tescil no:

Üretim Tarihi:

Son kullanma tarihi: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürün parti no:

UYGULAMA DOZAJLARI

Toprak uygulaması

- **Meyve, narenciye ve zeytin ağaçlarında:** Verilecek miktar eksiklik oranına ve ağaç büyüklüğüne göre belirlenir. Toplam dozaj iki uygulamada verilir.
- **Ağaçlarda:** Genç ağaçlarda 8-15 gr/ağaç; ürüne yatma başlangıcındaki ağaçlarda 15-40 gr/ağaç; küçük meyve ağaçlarında 5-15 gr/ağaç; tam verim çağında (ürüne yatmış) ağaçlarda 50-90 gr/ağaç kullanılır.
- **Bağda:** Her bir asma için 5-10 gr veya verime yatmış bağlarda kış sonunda dekara 2-4 kg kullanılır. Yeni dikilmiş asma çubukları için 2-4 gr kullanılması uygundur.
- **Çiçeklerde:** 3-6 gr/m² kullanılır.
- **Süs bitkilerinde:** Fidan başına 50-100 gr ve ağaç başına 100-200 gr kullanılır.
- **Sebzelerde:** 1-7 gr/m² kullanılır.
- **Otsu bitkilerde:** Dekarda 500-1000 gr kullanılır.
- **Suda yetiştirilen ürünlerde (hidroponik):** 1.000 litre suya 1-1,5 kg karıştırılarak kullanılır (100 kez yoğunlaştırılmış).

Damla sulama ile gübreleme

- **Sebzelerde:** Her bir uygulamada 1-2 kg ürün 10.000 litre su ile sulandırılarak, yetiştirme dönemi içinde 2-3 kez dekara 1-3 kg olacak şekilde uygulanır.

Çiçeklerde: Haftada bir kez 0,5 gr/litre solüsyon ile sulanır.

Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri: Net Ağırlık : 0,5-1-5-10-15- 20-25-30-35-40- 50 kg

ÜRÜNÜN İTHALATI İSPANYA'DAN YAPILMIŞTIR.

İTHALATÇI FİRMA: LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 1.Kısım Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı /Antalya

Tel: 0 242 321 19 98 Fax: 0 242 322 98 81 www.lidergubre.com.tr

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ.

